

Qu'est ce que cela signifie ?

Une sérologie confirmée **positive signifie** que **vous avez été contaminé-e par le VIH**, et que vous êtes séropositif-ve. **Être séropositif-ve ne veut pas dire que vous avez le sida** ou que vous le développerez un jour.

Être séropositif-ve signifie que **vous pouvez transmettre le virus** si vous avez des pratiques sexuelles sans préservatif, si vous n'avez pas de traitement contre le VIH, ou si vous partagez du matériel de consommation de produits psychoactifs (seringues, pailles de snif,..)

Si vous êtes séropositif-ve, vous serez **orienté-e vers un médecin spécialiste** pour bénéficier d'une **prise en charge médicale et d'un traitement anti-VIH**.

Un traitement efficace contre le VIH permet une espérance de vie presque identique à celle d'une personne séronégative. Ce traitement **réduit le risque de transmission du VIH à ses partenaires et permet d'envisager d'avoir un enfant sans risque de transmission à celui-ci.**




Vous pouvez trouver une aide à la réalisation de votre autotest auprès de Sida Info Service :

au 0 800 840 800

ou sur : www.sida-info-service.org

En région, les COREVIH et les Associations de soutien vous informent sur les lieux de dépistage et de prise en charge médicale et psychologique.



Autotest VIH
Conseils à lire
avant utilisation

L'Autotest VIH ?

Attention : Cet autotest est fiable pour toute prise de risque datant de plus de trois mois.

Vous vous apprêtez à réaliser un test rapide de l'infection à VIH (virus responsable du sida). Ce test permet uniquement de détecter ce virus, il ne vous indiquera aucune autre infection (Infection Sexuellement Transmissible, Hépatites,...)

Sachez que l'autotest n'est pas le seul test disponible pour se dépister. Il vous est possible de vous rendre dans un Centre d'Information, de Dépistage et de Diagnostic (CeGIDD) dans un laboratoire de ville, dans un service infectieux de l'hôpital le plus proche ou encore dans une association, afin de pratiquer un test classique par prise de sang ou un dépistage rapide par Test Rapide d'Orientation Diagnostique (TROD).

CONDUITES À TENIR :

Pour que ce test soit fiable, il est important de vous conformer scrupuleusement à la notice d'utilisation, que vous trouverez dans la boîte. Installez-vous sur une surface plane et propre. Lavez-vous les mains soigneusement et préparez le matériel. La lecture du résultat se fait 15 mn après la réalisation du test.

Votre test est négatif :

CELA SIGNIFIE QUE VOUS N'ÊTES PAS INFECTÉ-E PAR LE VIH.

À savoir :
dès 6 semaines après un risque, vous avez la possibilité de vous faire dépister par prise de sang en laboratoire ou en CeGIDD

Si vous avez un doute par rapport à d'éventuelles prises de risques et à l'utilisation de ce test, pensez au préservatif masculin ou féminin avec votre (vos) partenaire(s) et envisagez rapidement un dépistage.

Il existe un traitement post exposition (TPE) à commencer au mieux dans les 4h au plus tard dans les 48h après un risque. Il est disponible dans les services d'urgence de l'hôpital le plus proche où un médecin évaluera avec vous le risque pris et l'intérêt de vous prescrire ce traitement d'urgence. N'hésitez pas à venir avec votre (vos) partenaire(s).

D'autres infections sexuellement transmissibles (syphilis, gonocoque, chlamydiae, herpès, papillomavirus, etc...) et les hépatites peuvent passer inaperçues car elles provoquent parfois peu de symptômes... La plupart d'entre elles se soignent facilement mais, non traitées, elles peuvent entraîner des complications et fragiliser les muqueuses, ce qui augmente le risque d'infection par le VIH.

Lorsqu'on a plusieurs partenaires, il est recommandé de dépister de manière régulières ces IST.

Faire ses dépistages (du VIH ou des IST) c'est prendre soin de soi et des autres. Aussi n'hésitez à les renouveler quand vous le souhaitez, mais au moins une fois par an !

Votre test est positif :

CELA SIGNIFIE QUE VOUS ÊTES PROBABLEMENT INFECTÉ-E PAR LE VIH.

*(Virus responsable du sida).

Ce premier résultat doit être confirmé par une prise de sang (sérologie) réalisée en laboratoire sur prescription médicale, en centre de dépistage (CeGIDD) ou à l'hôpital.

Les résultats de cet examen sanguin vous seront donnés par un médecin quelques jours après le prélèvement. En attendant ce résultat, pensez à un préservatif masculin ou féminin lors de vos rapports sexuels, même en cas de sexe oral, pour éviter de transmettre ce virus.

