

**VIH,
Infections Sexuellement
Transmissibles (IST)**

Un rapport non protégé ?
Ne laissez pas le doute s'installer,
se faire dépister est devenu
plus simple.

3 possibilités selon votre situation :
demandez conseil à votre biologiste.

**Le dépistage sauve des vies,
à commencer par la vôtre.**

Cachet du laboratoire



**VIH, IST* :
ne les transmettez pas,
dépistez vous**



**3 solutions simples,
pour vous faire dépister,
selon votre situation**

*Infections Sexuellement Transmissibles

Entre 4h et 48h maximum

Rendez-vous dans un service d'urgence pour une consultation et un traitement post exposition (TPE).

1

2

3

Dès 6 semaines après

Dès 6 semaines après

Après plus de 3 mois

Accompagné(e) dans un CeGIDD

(Centre Gratuit d'Information, de Dépistage et de Diagnostic)

- ✓ Accès libre avec ou sans prescription.
- ✓ Confidentialité.
- ✓ Accompagnement et conseils.

Pour qui ? Pour ceux qui veulent une réponse fiable, du conseil et qui se trouvent dans le voisinage d'un CeGIDD.

Liste sur www.sida-info-service.org

Accompagné(e) près de chez vous

Dans votre **laboratoire d'analyses médicales**

- ✓ Accès libre avec ou sans prescription.
- ✓ Confidentialité.
- ✓ Analyse remboursée à 100% avec une ordonnance.
- ✓ Accompagnement et conseils.

Pour qui ? Pour ceux qui veulent une réponse fiable, du conseil et un accompagnement **près de chez eux**.

Seul(e) chez vous

L'Auto test VIH

- ✓ En vente dans les pharmacies.
- ✓ Confidentialité et conseil.

Vous réalisez ce test seul. Vous devez veiller à bien respecter les conditions de réalisation détaillées dans la notice explicative. Une analyse de confirmation en laboratoire d'analyses médicales est nécessaire pour tout résultat positif. Un test négatif est fiable si et seulement si le patient est sûr de ne pas avoir pris de risques depuis trois mois et s'il a bien conservé le kit et bien réalisé l'examen.

